

# Turex

Controla orugas de lepidópteros



TUREX es un insecticida específico que actúa por ingestión para el control de orugas de lepidópteros. Su punto de acción primario corresponde a los disruptores microbianos de las membranas digestivas, originando la muerte de las orugas entre 1 y 7 días posteriores a la aplicación. Su materia activa es totalmente selectiva, y por tanto compatible con la suelta de organismos de control biológico.

## Riquezas garantizadas

BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI

50% [WG] P/P

## Beneficios

Rápida acción: origina la muerte de los insectos de 1-7 días desde su uso

Compatible con otros organismos de control biológico

No deja residuos en el cultivo



## Modo de aplicar

Utilizar las dosis más bajas en los primeros estadios de desarrollo y aumentar la dosis con la presencia de orugas más desarrolladas. Aplicar en pulverización, diluido en la suficiente cantidad de agua, según técnicas de aplicación.

**Dosis:**  
Ver anexo

## Precauciones y advertencias

Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar guantes, prendas y máscara de protección. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre. En caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o acudir a un médico. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C.

[www.alvinutrientes.com](http://www.alvinutrientes.com)

Consulte a nuestro Departamento Técnico para Apoyo en Programas de Fertilización  
Nutrientes Alvi, S.L. Pol. Ind. Primores, C/ Pintores 7-9, Autovía del Mediterráneo-A7, salida 420 • CP 04745 La Mojonera, Almería (España)  
Oficina +34 950 55 73 43 • Nave +34 950 55 80 44 • [info@alvinutrientes.com](mailto:info@alvinutrientes.com)

CULTIVO / ESPECIE	PLAGA / EFECTO	DOSIS	NOTAS
Acelga	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Achicoria	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Albaricoquero	Orugas defoliadoras	0,1-0,13 Kg/hL	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000- 1500 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH67 (flores marchitándose) hasta BBCH89 (madurez de consumo).
Alcachofa	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Realizar al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (Madurez completa).
Algodonero	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Realizar al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (Madurez completa).
Apio	Orugas defoliadoras	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Berenjena	Orugas defoliadoras Tuta absoluta	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa)
Cardos comestibles	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 Semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Cerezo	Orugas defoliadoras	0,1-0,13 Kg/hL	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000-1500 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH67 (flores marchitándose) hasta BBCH89 (madurez de consumo).
Ciruelo	Orugas defoliadoras	0,1-0,13 Kg/hL	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000-1500 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH67 (flores marchitándose) hasta BBCH89 (madurez de consumo).

CULTIVO / ESPECIE	PLAGA / EFECTO	DOSIS	NOTAS
Colza	Orugas defoliadoras	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Realizar al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (Madurez completa).
Cucurbitáceas (sandía, melón, calabacín, calabaza y pepino)	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Espinacas	Orugas defoliadoras	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Flor cortada	Orugas defoliadoras	0,1-0,2 Kg/hL	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Fresal	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500- 1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (Segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Hierbas aromáticas (Albahaca, valeriana, hinojo, perejil y eneldo)	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500- 1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (2 hojas desplegadas) hasta BBCH89 (segunda cosecha).
Hierbas frescas	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500- 1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Hortalizas gen brassicas	Orugas defoliadoras	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500- 1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
	Pieris sp.	0,5-1 Kg/ha	Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (Madurez completa).
Judías para grano	Orugas defoliadoras	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (Madurez completa).

CULTIVO / ESPECIE	PLAGA / EFECTO	DOSIS	NOTAS
Judías verdes	Orugas defoliadoras	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (Madurez completa).
Kiwi	Orugas defoliadoras	0,1-0,13 Kg/hL	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000- 1500 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH67 (flores marchitándose) hasta BBCH89 (madurez de consumo).
Lechugas y similares	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500- 1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa)
Manzano	Orugas de la piel Orugas defoliadoras	0,1-0,13 Kg/hL 0,1-0,13 Kg/hL	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000-1500 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH53 (apertura de yemas) hasta BBCH99 (partes cosechadas).
Melocotonero y similares	Orugas defoliadoras	0,1-0,13 Kg/hL	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000-1500 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH67 (flores marchitándose) hasta BBCH89 (madurez de consumo).
Nabo	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Nectarino	Orugas defoliadoras	0,1-0,13 Kg/hL	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000-1500 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH67 (flores marchitándose) hasta BBCH89 (madurez de consumo)
Olivo	Prays oleae	200 g/hL	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización).
Patata	Orugas defoliadoras	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000-1500 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Peral	Orugas de la piel	0,1-0,13 Kg/hL	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000-1500 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH53 (apertura de yemas) hasta BBCH99 (partes cosechadas).
	Orugas defoliadoras	0,1-0,13 Kg/hL	
Pimiento	Orugas defoliadoras	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).

CULTIVO / ESPECIE	PLAGA / EFECTO	DOSIS	NOTAS
Rábano	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Remolacha	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Rúcula	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Tabaco	Orugas defoliadoras	1,5-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
Tomate	Orugas defoliadoras	1-2 Kg/ha	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. Incluye al aire libre e invernadero. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH12 (segunda hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez completa).
	Tuta absoluta	1-2 Kg/ha	
Vid	Polillas del racimo	0,1-0,2 Kg/hL	Realizar de 2 a 4 aplicaciones con un volumen de caldo de 1000 L/ha. Incluye al aire libre. Intervalo entre aplicaciones de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización). Aplicar desde BBCH53 (inflorescencias claramente visibles) hasta BBCH99 (partes cosechadas).

Plazo de seguridad: No procede en ninguno de los cultivos mencionados.